



3. INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA PERSONELU IZBY PRZYJĘĆ SZPITALA NIESPECJALISTYCZNEGO LUB LEKARZA POZ W PRZYPADKU PODEJRZENIA ZAKAŻENIA WIRUSEM EBOLA

1) Pacjent, który miał kontakt z chorym, bez objawów chorobowych.

1. Izbę Przyjęć lub gabinet zabezpieczyć przed dostępem innych osób.
2. Niezwłocznie powiadomić właściwego miejscowo i rzeczowo (dot. szczególnie Państwowego Inspektora Sanitarnego MSW na obszarze woj. kujawsko-pomorskiego) Państwowego Inspektora Sanitarnego i Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Bydgoszczy .
3. Osoby znajdujące się już w Izbie Przyjęć zatrzymać do czasu uzyskania wytycznych od właściwego miejscowo i rzeczowo Państwowego Inspektora Sanitarnego.
4. Przed przystąpieniem do badania nałożyć ubranie ochronne: półmaska w klasie FFP 3, gogle ochronne lub przyłbica, czepek, fartuch nieprzemakalny, podwójne rękawice ochronne.
5. Zebrać dane osobowe pacjenta (imię, nazwisko, adres, telefon) oraz przeprowadzić wywiad epidemiologiczny.
6. Do czasu podjęcia decyzji przez właściwego miejscowo i rzeczowo Państwowego Inspektora Sanitarnego o dalszym postępowaniu w stosunku do pacjenta (indywidualny nadzór epidemiologiczny, kwarantanna) umieszczamy pacjenta w oddzielnym pomieszczeniu najlepiej z dostępem do toalety.
7. Zużyte ubranie ochronne należy traktować jako odpad medyczny zakaźny. Kolejność zdejmowania przedstawia się następująco: pierwsza warstwa rękawic ochronnych,

fartuch ochronny, czepek, gogle ochronne lub przyłbica, maska, druga para rękawic ochronnych.

8. Po opuszczeniu przez pacjenta pomieszczenia poddać je procedurze dezynfekcji zgodnie z obowiązującym w jednostce Planie Higieny. Użyty preparat dezynfekcyjny musi posiadać pełną skuteczność wirusobójczą wynikającą z badań przeprowadzonych wg. normy PN EN 14476. Osoby przeprowadzające dezynfekcję powinny stosować właściwe środki ochrony indywidualnej.

2) Pacjent, który przebywał w ciągu ostatnich 21 dni w krajach objętych epidemią, negujący / nie potwierdzający kontaktu z chorym (kraje: Liberia, Gwinea, Sierra Leone, Demokratyczna Republika Konga).

1. Przed przystąpieniem do badania nałożyć ubranie ochronne: półmaska w klasie FFP 3, gogle ochronne lub przyłbica, czepek, fartuch nieprzemakalny, podwójne rękawice ochronne.
2. Zebrać dane osobowe pacjenta (imię, nazwisko, adres, telefon) oraz przeprowadzić wywiad epidemiologiczny.
3. Poinformować pacjenta o konieczności prowadzenia samoobserwacji przez okres 21 dni od daty wyjazdu z kraju objętego epidemią (pomiar temperatury rano i wieczorem).
4. W przypadku występowania takich objawów jak: wzrost temperatury ($\geq 38,6$ °C), silne bóle głowy, bóle mięśni, wymioty, biegunka, samoistne krwawienia/wylewy krwi podskórne i w obrębie błon śluzowych) niezwłocznie skontaktować się z właściwym miejscowo i rzeczowo Państwowym Inspektorem Sanitarnym i Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego w Bydgoszczy .
5. Zużyte ubranie ochronne należy traktować jako odpad medyczny zakaźny. Kolejność zdejmowania przedstawia się następująco: pierwsza warstwa rękawic ochronnych, fartuch ochronny, czepek, gogle ochronne lub przyłbica, maska, druga para rękawic ochronnych.
6. Po opuszczeniu przez pacjenta pomieszczenia poddać je procedurze dezynfekcji zgodnie z obowiązującym w jednostce Planie Higieny. Użyty preparat dezynfekcyjny musi posiadać

pełną skuteczność wirusobójczą wynikającą z badań przeprowadzonych wg normy PN EN 14476. Osoby przeprowadzające dezynfekcję powinny stosować właściwe środki ochrony indywidualnej.

3) Postępowanie z pacjentem wracającym z kraju objętego epidemią, zwłaszcza gdy potwierdza wcześniejszy kontakt z chorym, u którego występuje jeden z następujących objawów: gorączka $\geq 38,6$ °C, silne bóle głowy, bóle mięśni, wymioty, biegunka, samoistne krwawienia/wylewy krwi podskórne i w obrębie błon śluzowych.

1. Izbę Przyjęć lub gabinet zabezpieczyć przed dostępem innych osób.
2. Bezzwłocznie powiadomić dyspozytora medycznego Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy, jako jednostki referencyjnej, wskazanej do transportu pacjentów z podejrzeniem zarażenia wirusem Ebolą , właściwego miejscowo i rzeczowo Państwowego Inspektora Sanitarnego i Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Bydgoszczy o podejrzeniu zachorowania pacjenta na Ebolę.
3. Osoby znajdujące się już w Izbie Przyjęć lub gabinecie zatrzymać do czasu uzyskania wytycznych od właściwego miejscowo i rzeczowo Państwowego Inspektora Sanitarnego.
4. Postępować zgodnie z uzyskanymi wytycznymi właściwego miejscowo i rzeczowo Państwowego Inspektora Sanitarnego.
5. Przed kontaktem z chorym należy zastosować środki ochrony indywidualnej: ochraniacze na buty, półmaska lub maska pełno-twarzowa z filtrem klasy FFP 3, gogle lub przyłbica (w przypadku zastosowania półmaski), czepek ochronny, kombinezon PPE (klasy TYCHEM F), dodatkowy fartuch gumowy lub z foli PE, trzy warstwy rękawic ochronnych. W przypadku rękawic należy pamiętać, aby mankiety pierwszej warstwy rękawic podłożyć pod rękawy kombinezonu PPE, a mankiety drugiej i trzeciej na mankiety kombinezonu PPE. Jeżeli nie ma konieczności podejścia do pacjenta należy pozostawić go w gabinecie, w którym został przyjęty lub innym pomieszczeniu, w którym została powzięta informacja o jego przybyciu.
6. Zużyte ubranie ochronne należy traktować jako odpad medyczny zakaźny. Kolejność zdejmowania przedstawia się następująco: fartuch gumowy lub z foli PE, rękawice wierzchnie, kombinezon PPE wraz z ochraniaczami na obuwiu, druga warstwa rękawic

ochronnych, czepek, gogle lub przyłbica w przypadku półmaski FFP3 lub maska pełnotwarzowa, trzecia warstwa rękawic.

7. Po opuszczeniu przez pacjenta pomieszczenia poddać je procedurze dezynfekcji zgodnie z obowiązującym w jednostce Planie Higieny. Użyty preparat dezynfekcyjny musi posiadać pełną skuteczność wirusobójczą wynikającą z badań przeprowadzonych wg normy PN EN 14476. Osoby przeprowadzające dezynfekcję powinny stosować właściwe środki ochrony indywidualnej.

Należy pamiętać, że choroba Ebola jest wysoce zakaźna i charakteryzuje się wysoką śmiertelnością osób zakażonych. O ile to możliwe należy unikać bliskiego kontaktu z pacjentem.